

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tüzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 17. melléklete)

Gyermekágyi abrázió
MÉHŰRI JÓDOS ÖBLÍTÉS

Tisztelt Asszonyom!

Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a gyermekágyi kaparásnak, illetve az azt követő jódvizes öblítésnek, mi a javallati köre, technikai kivitele, s mi a következménye.

A gyermekágyi kaparás olyan betegségekről ad felvilágosítást, melynek háttérében lepényrész, burokész visszamaradás, nagyon ritkán gyulladások állnak, gyakran jelent indokot az erős vérzés csillapítása is. Tehát egyben therápiás hatásúnak mondható.

Az ilyenkor eltávolított szövetminta mikroszkópos vizsgálata alapvető kiindulópont annak eldöntésére, hogy ártalmatlan elváltozással, vagy komoly betegséggel állnak-e szemben. Ezek alapján dönthető el, hogy milyen további kezelések szükségesek.

A műtét kivitelezése:

A külső nemi szervek fertőtlenítése után a kaparás előtt ritkán szükség van a méhszáj műszeres tágítására. A méhnyálkahártyát egy karcsú műszerrel lekaparjuk, a méhet kiürítjük, majd jódvizes oldattal az uterus üregét átöblítjük.

A beavatkozás fájdalmas, ezért általános érzéstelenítésben (altatásban) esetenként helyi érzéstelenítéssel végezzük.

Szövődmények:

A kezelés sikerességét és az abszolút kockázatmentességet egyetlen orvos sem garantálhatja. Az olyan általános szövődmények, mint a gyulladás, trombózis, embólia, utóvérzések az orvostudomány fejlődésének köszönhetően sokkal ritkábban fordulnak elő, és sokkal többet tudunk ellene tenni, mint korábban. Abráziónál szövődmények sokkal ritkábban fordulnak elő. Néha előfordulhat, hogy a méhfalon egy vékony eszköz áthatol. Ez a komplikáció legtöbbször veszélytelen és további kezelést nem igényel. Csak ritkábban fordul elő (pl. vérzés miatt), hogy has tükrözésre, hasi műtetre, esetleg a méh eltávolítására kényszerülünk.

A méh és a függelék gyulladása, vagy utóvérzés a beavatkozás után több nappal is felléphet. Ezek orvosi kezelést igényelnek és mindig jól gyógyíthatók, ezért láz, fájdalom, erősebb vérzés esetén haladéktalanul keresse fel Osztályunkat.

Műtét utáni javaslatok:

3 hétig tampon használat, hüvelyöblítés, ülőfürdő, házasélet tilos.

A szövettani vizsgálat kb. 10 nap alatt készül el, ennek megbeszélése céljából kezelőorvosát keresse fel.